Corrigé Exercice 1

PARTIE I

1.

2. a. $p(D \cap T) = p(D) \times p_D(T) = 0,05 \times 0,98 = 0,049$

La probabilité qu'une pièce soit défectueuse et aie un test positif est de **4,9 %**

b. $p(T) = p(D \cap T) + p(\bar{D} \cap T) = 0,049 + 0,95 \times 0,03 = 0,0775$

3. $p_T(D) = \frac{p(D \cap T)}{p(T)} = \frac{0,049}{0,0775} \approx 0,632$

Sa valeur prédictive est d'environ 63 %, donc bien inférieure à la valeur exigée. **Le test n'est donc pas efficace.**

PARTIE II

1. Il s'agit d'une **répétition** de 20 épreuves de Bernoulli **indépendantes**, de probabilité de **succès** 0,05 : la variable X suit bien une loi binomiale de **paramètres** $n = 20$ et $p = 0,05$

2. $E(X) = np = 20 \times 0,05 = 1$

Sur un grand nombre d'échantillon, il y aura en moyenne une pièce défectueuse par échantillon.

3. $p(X = 5) = \binom{20}{5} \times 0,05^5 \times (1 - 0,05)^{20-5} = 15504 \times 0,05^5 \times 0,95^{15} \approx 0,002$

Il y a environ **0,2%** de chances que l'échantillon contienne exactement 5 pièces défectueuses

4. On cherche le nombre n de pièces tel que $p(X > 5) \geq 0,01$, c'est-à-dire tel que $1 - p(X \leq 5) \geq 0,01$
En utilisant le tableur de la calculatrice, avec n comme inconnue, on trouve :

pour $n = 37$, $p(X > 5) \approx 0,0095$ et pour $n = 38$, $p(X > 5) \approx 0,0109$

Il faudra donc au minimum 38 pièces dans l'échantillon pour avoir plus de 10% de chances d'y trouver plus de 5 pièces défectueuses

Acceptation de l'inégalité large : $p(X \geq 5) = 1 - p(X \leq 4)$

et alors pour $n = 26$, $p(X > 5) \approx 0,0085$ et pour $n = 27$, $p(X > 5) \approx 0,01002$

donc à partir de 27 pièces

Corrigé Exercice 2

Partie I

En 10 minutes, les gâteaux sont passés de -19°C à $1,3^{\circ}\text{C}$, soit un différentiel de $1,3 - (-19) = 20,3^{\circ}\text{C}$

Donc si l'augmentation est constante, elle est de $\frac{20,3}{10} = 2,03^{\circ}\text{C}$ par minute

Donc 25 minutes après la sortie du congélateur, les gâteaux seraient à $-19 + 2,03 \times 25 = 31,75^{\circ}\text{C}$

Il n'est pas possible qu'ils deviennent plus chaud que la température extérieure : **le modèle n'est donc pas pertinent.**

Partie II

1. $T_{n+1} - T_n = -0,06 \times (T_n - 25) = T_n - 0,06 \times (T_n - 25) = T_n - 0,06T_n + 1,5 = 0,94T_n + 1,5$ **CQFD**

2. $T_1 = 0,94T_0 + 1,5 = 0,94 \times (-19) + 1,5 = -16,36 \approx -16,4$
 $T_2 = 0,94 \times (-16,36) + 1,5 \approx -13,9$

3. À la calculatrice, on trouve $T_{17} \approx 9,6$ et $T_{18} \approx 10,6$

Donc Cécile doit déguster son gâteau entre 17 et 18 minutes après les avoir sorti du congélateur.

4. a. $U_{n+1} = T_{n+1} - 25 = 0,94T_n + 1,5 - 25 = 0,94(T_n + 25) - 23,5 = 0,94U_n + 23,5 - 23,5 = 0,94U_n$
et $u_0 = T_0 - 25 = -19 - 25 = -44$

(U_n) est bien une suite géométrique de raison **0,94** et le premier terme $U_0 = -44$

b. On a alors $U_n = U_0 \times q^n = -44 \times 0,94^n$ et $T_n = U_n + 25 = -44 \times 0,94^n + 25$ **CQFD**

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} 0,94^n = 0$ car $0,94 \in]-1; 1[$ donc $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = -44 \times 0 + 25 = 25$

À terme, les gâteau finiront par se stabiliser à la température ambiante, soit 25°C

Partie III

1. Initialisation :

Pour $n = 0$, on a $\theta_n = \theta_0 = -19$ et $-0,05n^2 + 2,5n - 19 = -0,05 \times 0 + 2,5 \times 0 - 19 = -19$

L'égalité est vraie pour $n = 0$

Hypothèse :

On suppose qu'il existe un entier naturel p quelconque pour lequel on a $\theta_p = -0,05p^2 + 2,5p - 19$

Hérédité :

pour $n = p + 1$, on a d'une part :

$$\begin{aligned}\theta_n &= \theta_{p+1} = \theta_p - 0,1p + 2,45 \\ &= -0,05p^2 + 2,5p - 19 - 0,1p + 2,45 \\ &= -0,05p^2 + 2,4p - 16,55\end{aligned}$$

et d'autre part :

$$\begin{aligned}-0,05(p+1)^2 + 2,5(p+1) - 19 & \\ &= -0,05p^2 - 0,1p - 0,05 + 2,5p + 2,5 - 19 \\ &= -0,05p^2 + 2,4p - 16,55\end{aligned}$$

L'égalité est vraie pour $n = p + 1$

Conclusion :

Pour tout entier naturel n , on a bien $\theta_n = -0,05n^2 + 2,5n - 19$

2. $\theta_{30} = -0,05 \times 30^2 + 2,5 \times 30 - 19 = 11$ **Les gâteaux auraient une température de 11°C**

Corrigé Exercice 3

1. On trouve : $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $E(0; 0; 1)$, $G(1; 1; 1)$ et $H(0; 1; 1)$.

2. a. Les longueurs EG , GD et DE sont les longueurs des diagonales de trois faces carrées identiques, donc elles sont égales. EGD est donc équilatéral.

b. On a $\overrightarrow{EG} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ donc $EG = \sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}$ donc l'aire de EGD est : $\frac{\sqrt{3}}{4} EG^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. CQFD

3. On a $\overrightarrow{BH}(-1,1,1)$ donc $\overrightarrow{BM} \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$ or avec $M(x; y; z)$ on a $\overrightarrow{BM}(x-1; y; z)$.

On en déduit que $x-1 = -\frac{1}{3} \Leftrightarrow x = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$; $y = \frac{1}{3}$; $z = \frac{1}{3}$.

En conclusion, on a bien : $M\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

4. a. On a : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{EG} = -1 + 1 + 0 = 0$ et $\vec{n} \cdot \overrightarrow{ED} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 + 1 - 1 = 0$

$\vec{n}$ étant orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (EGD) , il est donc normal à (EGD) .

b. (EGD) a donc une équation cartésienne de la forme $-x + y + z + d = 0$
Or $E \in (EGD) \Rightarrow d = x_E - y_E - z_E = 0 - 0 - 1 = -1$.

(EGD) a donc pour équation cartésienne $-x + y + z - 1 = 0$ CQFD

c. D est orthogonale au plan (EGD) de vecteur $\vec{n}$ donc $\vec{n}$ en est un vecteur directeur.

On a donc : $\mathcal{D} : \begin{cases} x = \frac{2}{3} - t \\ y = \frac{1}{3} + t \\ z = \frac{1}{3} + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

5. a. La hauteur en question est la droite (KM) perpendiculaire à (EGD) passant par M : c'est la droite $\mathcal{D}$ de

la question 4c. Il existe donc un nombre $t \in \mathbb{R}$ tel que : $\begin{cases} x_K = \frac{2}{3} - t \\ y_K = \frac{1}{3} + t \\ z_K = \frac{1}{3} + t \end{cases}$

Or $K \in (EGD)$ donc $-x_K + y_K + z_K - 1 = 0$

On obtient donc : $-\left(\frac{2}{3} - t\right) + \frac{1}{3} + t + \frac{1}{3} + t - 1 = 0 \Rightarrow 3t - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3}$

On a donc : $\begin{cases} x_K = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \\ y_K = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ z_K = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow K\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$ CQFD

b. Le volume de la pyramide $GEDM$ est donc égale à $\mathcal{V} = \frac{b \times h}{3}$ où b est l'aire du triangle EGD et h la hauteur issue de M .

D'après les questions 2b, 3 et 5a, on a donc : $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$h = KM = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{3}{9}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ D'où : $\mathcal{V} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}}}{3} = \frac{\frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{6}$

Corrigé Exercice 4

Partie I

1. On a $f'(0) = \frac{2}{5} = 0,4$ (lecture directe sur la courbe, attention à l'échelle), donc le coefficient directeur de la tangente à la C_f en 0 est de $\frac{2}{5}$

2. a. Lecture graphique :

x	-7	-2	1	7			
$f'(x)$	-0,3	↘	-0,7	↗	0,7	↘	0,3

b. On déduit des variations de f' :

x	-7	-2	1	7		
$f''(x)$		-	0	+	0	-

Donc f est convexe sur $[-2; 1]$

Partie II

1. $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+\frac{5}{2}}$

2. Pour $x^2 + x + \frac{5}{2}$, on a $\Delta = 1 - 4 \times \frac{5}{2} = -9$ il est donc de signe constant, positif

x	-10	$-\frac{1}{2}$	10		
$2x + 1$		-	0	+	
$x^2 + x + \frac{5}{2}$		+		+	
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$\ln\left(\frac{185}{2}\right)$	↘	$\ln\left(\frac{9}{4}\right)$	↗	$\ln\left(\frac{225}{2}\right)$

3. a. La fonction f est continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}; 10\right]$ et on a $f\left(-\frac{1}{2}\right) \approx 0,8$ et $f(10) \approx 4,7$: donc 2 est une valeur intermédiaire. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 2$ a une unique solution α dans l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}; 10\right]$

b. À la calculatrice, on trouve : $1,77 < \alpha < 1,78$ donc $\alpha \approx 1,8$

4. Pour $-2x^2 - 2x + 4$, on a $\Delta = 4 + 32 = 36$ et $x_1 = \frac{2+6}{-4} = -2$; $x_2 = \frac{2-6}{-4} = 1$

x	-10	-2	1	10		
$-2x^2 - 2x + 4$		-	0	+	0	-
$x^2 + x + \frac{5}{2}$		+		+		+
$f''(x)$		-	0	+	0	-

La courbe C_f admet 2 points d'inflexion : en $x = -2$ et en $x = 1$