Sujet bac n°1 (Adapté ex Bac ES)

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

Partie A - À l'aide d'un graphique

On a représenté ci-dessous la courbe $(C_{f'})$ de la fonction dérivée f' ainsi que la courbe $(C_{f''})$ de la fonction dérivée seconde f'' sur l'intervalle $[0 ; 5]$.

Le point A de coordonnées $(1 ; 0)$ appartient à $(C_{f'})$ et le point B de coordonnées $(2 ; 0)$ appartient à la $(C_{f''})$

1. Déterminer le sens de variation de la fonction f . Justifier.
2. Déterminer sur quel(s) intervalle(s), la fonction f est convexe. Justifier.
3. La courbe de f admet-elle des points d'inflexion? Justifier. Si oui, préciser leur(s) abscisse(s).

Partie B - Étude de la fonction

La fonction f est définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = 5xe^{-x}$.

1. Justifier que la fonction f est positive sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
2. a) Déterminer la limite de f en $+\infty$
b) Déterminer le tableau de variation complet de f sur $[0 ; +\infty[$. Vous indiquerez les valeurs exactes.
3. Montrer que l'équation $e^x = 5x$ n'admet qu'une unique solution α sur $[0 ; 1]$. En donner une valeur approchée à 10^{-2} .
4. Montrer que la fonction F définie sur $[0 ; +\infty[$ par $F(x) = (-5x - 5)e^{-x}$ est une primitive de f sur $[0 ; +\infty[$.

Sujet bac n°2 (Polynésie 21 adapté)

Cet exercice est composé de trois parties indépendantes.

On a représenté ci-contre, dans un repère orthonormé, une portion de la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$:

On considère les points $A(0; 2)$ et $B(2; 0)$.

Partie 1

Sachant que la courbe $\mathcal{C}$ passe par A et que la droite (AB) est la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A , donner par lecture graphique :

1. La valeur de $f(0)$ et celle de $f'(0)$.
2. Un intervalle sur lequel la fonction f semble convexe.

Partie 2

On note (E) l'équation différentielle : $y' = -y + e^{-x}$.

1. Vérifier que, pour tout réel k , la fonction $g_k(x) = (x - k)e^{-x}$ est une solution de l'équation (E)
2. Sachant que la fonction f est la solution particulière de (E) qui vérifie $f(0) = 2$, déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .

Partie 3

On admet que pour tout nombre réel x , $f(x) = (x + 2)e^{-x}$.

1. On rappelle que f' désigne la fonction dérivée de la fonction f .
 - a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (-x - 1)e^{-x}$.
 - b. Étudier le signe de $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et dresser le tableau des variations de f sur $\mathbb{R}$.
On ne précisera ni la limite de f en $-\infty$ ni la limite de f en $+\infty$.
On calculera la valeur exacte de l'extremum de f sur $\mathbb{R}$.
2. On rappelle que f'' désigne la fonction dérivée seconde de la fonction f .
 - a. Calculer pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x)$.
 - b. Peut-on affirmer que f est convexe sur l'intervalle $[0; +\infty[$?

Sujet bac n°3 (Adapté ex bac ES)

La courbe (C) ci-dessous représente, dans un repère orthonormé, une fonction f définie et dérivable sur $[0,5 ; 6]$. Les points A (1; 3) et B d'abscisse 1,5 sont sur la courbe (C)

Les tangentes à la courbe (C) aux points A et B sont aussi représentées en pointillés sur ce graphique, la tangente au point B est horizontale.

On note f' la fonction dérivée de f .

Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : ÉTUDE GRAPHIQUE

1. Déterminer $f'(1,5)$.
2. La tangente à la courbe (C) passant par A passe par le point de coordonnées (0 ; 2). Déterminer une équation de cette tangente.
3. Déterminer la convexité de la fonction f sur $[0,5 ; 6]$. Argumenter la réponse.

PARTIE B : ÉTUDE ANALYTIQUE

On admet que la fonction f est définie sur $[0,5; +\infty[$ par $f(x) = -2x + 5 + 3 \ln(x)$.

1. a. Montrer que ; pour tout $x \in [0,5; +\infty[$, on a :

$$f(x) = x \left(3 \frac{\ln x}{x} - 2 + \frac{5}{x} \right)$$

- b. Déterminer la limite de f quand x tend vers $+\infty$

2. Pour tout réel x de $[0,5 ; +\infty[$, calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{-2x+3}{x}$
3. Étudier le signe de f' sur $[0,5; +\infty[$ puis dresser le tableau de variation de f sur $[0,5; +\infty[$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution α sur $[0,5 ; +\infty[$. Donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près.
5. En déduire le tableau de signe de f sur $[0,5; +\infty[$
6. On considère la fonction F définie sur $[0,5; +\infty[$ par $F(x) = -x^2 + 2x + 3x \ln(x)$. Montrer que F est une primitive de f sur $[0,5; +\infty[$

Sujet bac n°4 (Asie 21 - 2 adapté)

Dans cet exercice, on s'intéresse à la croissance du bambou Moso de taille maximale 20 mètres. Le modèle de croissance de Ludwig von Bertalanffy suppose que la vitesse de croissance pour un tel bambou est proportionnelle à l'écart entre sa taille et la taille maximale.

Partie I : modèle discret

Dans cette partie, on observe un bambou de taille initiale 1mètre.

Pour tout entier naturel n , on note u_n la taille, en mètre, du bambou n jours après le début de l'observation.

On a ainsi $u_0 = 1$.

Le modèle de von Bertalanffy pour la croissance du bambou entre deux jours consécutifs se traduit par l'égalité :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05(20 - u_n) \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

1. Vérifier que $u_1 = 1,95$.

2. a. Montrer que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,95u_n + 1$.

b. On pose pour tout entier naturel n , $v_n = 20 - u_n$.

Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera le terme initial v_0 et la raison.

c. En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = 20 - 19 \times 0,95^n$.

3. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Partie II : modèle continu

Dans cette partie, on souhaite modéliser la taille du même bambou Moso par une fonction donnant sa taille, en mètre, en fonction du temps t exprimé en jour.

D'après le modèle de von Bertalanffy, cette fonction est solution de l'équation différentielle

$$(E) \quad y' = 0,05(20 - y)$$

où y désigne une fonction de la variable t , définie et dérivable sur $[0 ; +\infty[$ et y' désigne sa fonction dérivée.

Soit la fonction L définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $L(t) = 20 - 19e^{-0,05t}$.

1. Vérifier que la fonction L est une solution de (E) et qu'on a également $L(0) = 1$.

2. On prend cette fonction L comme modèle et on admet que, si on note L , sa fonction dérivée, $L'(t)$ représente la vitesse de croissance du bambou à l'instant t .

a. Comparer $L'(0)$ et $L'(5)$.

b. Calculer la limite de la fonction dérivée L' en $+\infty$.

Ce résultat est-il en cohérence avec la description du modèle de croissance exposé au début de l'exercice?